

Cystoskopia giętka / Kalibracja cewki

Informacje dla pacjenta

Przed zabiegiem

- **Leki przeciwkrzepliwe:** Bardzo ważne jest zgłoszenie zażywania leków przeciwzakrzepowych przed badaniem.
- **Higiena:** Podstawowa higiena intymna wystarczy. Nie musisz być na czczo.
- **Opróżnienie pęcherza:** Tuż przed samym zabiegiem zostaniesz poproszony o oddanie moczu (chyba że lekarz zdecyduje inaczej).

Po zabiegu

- **Naturalne objawy:** Przez 1–2 dni możesz odczuwać pieczenie podczas oddawania moczu, a w moczu mogą pojawić się krople krwi. Jest to całkowicie normalne.
- **Nawodnienie:** Pij dużo wody (około 2–2,5 litra na dobę), aby „przeplukać” drogi moczowe.
- **Aktywność i używki:** Przez 7 dni obowiązuje zakaz intensywnego wysiłku fizycznego, podnoszenia ciężarów oraz spożywania alkoholu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego krwawienia.
- **Wizyta kontrolna:** Po zabiegu kalibracji cewki lub w przypadku pobrania wycinków podczas cystoskopii, konieczna jest wizyta kontrolna po 1–2 tygodniach.